Cifarma

4001227/R2

# AFTINE®

**sulfato de neomicina - DCB: 06284**
**tartarato de bismuto e sódio - DCB: 00353**
**mentol - DCB: 05643**
**cloridrato de procaína - DCB: 07383**

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**
**AFTINE®** suspensão oral gotas - Embalagem contendo um frasco gotejador de 20mL.
**USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO**
**COMPOSIÇÃO**
Cada mL de **AFTINE®** gotas contém:
sulfato de neomicina ..... 15mg
tartarato de bismuto e sódio ..... 25mg
mentol..... 1mg
cloridrato de procaína .....15mg
Excipientes q.s.p..... 1mL
(sacarina sódica, propilenoglicol, hidróxido de sódio, glicerol, álcool etílico e água purificada).

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**
**AFTINE ®** é eficaz nos casos de aftas e outras afecções bucais. A neomicina combate as bactérias, o tartarato de bismuto e sódio possui ação antisséptica; o cloridrato de procaína atua como anestésico, e o mentol age como adstringente. **AFTINE®** deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 ºC e 30ºC), protegido da luz. **AFTINE®** possui prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que observados os cuidados de conservação.

**Não use o produto se o prazo de validade estiver vencido. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe também se estiver amamentando. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico o aparecimento de quaisquer reações desagradáveis. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**
O sulfato de neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo, bactericida, ativo contra numerosas bactérias Gram-positivas. Atravessa a membrana celular bacteriana mediante transporte ativo e interfere na síntese protéica. A neomicina não é absorvida pela pele intacta, todavia, a neomicina aplicada topicamente é facilmente absorvida através de grandes regiões expostas, queimadas ou com tecido de granulação. O tartarato de bismuto e sódio possui ação antisséptica direta *in vitro* sobre o streptococo. O streptococo é o agente etiológico único causador destas afecções (angina pultácea). O cloridrato de procaína possui ação anestésica tópica, aliviando a dor. O mentol possui ação adstringente.

**INDICAÇÕES**
**AFTINE®** é indicado como medicação tópica auxiliar no tratamento das afecções bucais.

**CONTRAINDICAÇÕES**
**AFTINE®** não deve ser utilizado por pacientes sensíveis a qualquer um dos componentes da formulação.

**REAÇÕES ADVERSAS**
Durante a experiência pós-comercialização, observou-se que o medicamento pode ocasionar escurecimento na língua causado pelo ativo tartarato de bismuto e sódio. Esse escurecimento é temporário, desaparecendo após a suspensão do uso do medicamento.

**POSOLOGIA E MODO DE USAR**
Pingar uma ou duas gotas no local da afecção, 3 a 6 vezes ao dia. **Agite antes de usar.**

**PACIENTES IDOSOS**
Não constam na literatura relatos sobre advertências ou recomendações especiais do uso adequado por pacientes idosos.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO.**

**CIFARMA - Científica Farmacêutica Ltda.**
Rod. BR 153, Km 5,5 – Jardim Guanabara – CEP: 74675-090 – Goiânia / GO
CNPJ: 17.562.075/0001-69 - Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122
Reg. M.S.: 1.1560.0080

cac
0800 707 1212
www.cifarma.com.br

PAPEL RECICLÁVEL