Texto de rotulagem

Alumimax
Hidróxido de alumínio 60 mg/mL

AGITA ANTES DE USAR

Uso oral
USO ADULTO
SUSPENSÃO ORAL

ANTIÁCIDO

Contém 100 mL

COMPOSIÇÃO
Cada mL contém: hidróxido de alumínio 6mg e excipiente q.s.p. 1mL.

Indicações: antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

Modo de usar: uso interno. De 5 a 10 mL, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.

Advertências: Agite antes de usar. Obstipante.

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz e da umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 de 2006. AFE nº 1.03841-3.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Natulab Laboratório S. A.
Rua H Nº 02, Galpão III - Urbis II
Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.574-150
CNPJ 02.456.955/0001-83
Responsável Técnico: Tales de Vasconcelos Cortes
CRF/BA 3745

Indústria Brasileira

Natulab

Texto de rotulagem

Assinatura do SAC
0800 730 7370
www.natulab.com.br

Cód. de barras: 7898133134456