Texto de rotulagem

Hidraplex
cloreto de sódio 3,5g
cloreto de potássio 1,5g
citrato de sódio di- hidratado 2,9g
glicose 20g

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL
uso oral
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

sabor uva

Contém 04 envelopes de 27,9g

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.03841-3.

Natulab Laboratório S. A.
Rua H Nº 02, Galpão III - Urbis II
Santo Antônio de Jesus - BA
CEP 44.574-150
CNPJ: 02.456.955/0001-83
Responsável Técnico: Tales de Vasconcelos Cortes
CRF/BA 3745

Indústria Brasileira

Assinatura do SAC
0800 730 7370
www.natulab.com.br

Código de barras: 7898133137358
Raspe aqui com um objeto de metal

COMPOSIÇÃO
Cada envelope contém: cloreto de sódio 3,5g, cloreto de potássio 1,5g, citrato de sódio di- hidratado 2,9g e glicose 20g e excipiente q.s.p. Excipientes: Sucralose, essência de uva e corante azul brilhante e corante vermelho bordeaux.

Composição por litro da solução preparada: sódio 90 mEq/L, potássio 20 mEq/L, cloreto 80 mEq/L, citrato 30 mEq/L e glicose 111 mmol/L.

Indicação: Indicado para reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação), ou para manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em caso de diarreia aguda.

Modo de usar: Uso interno. Dissolver o envelope em um litro de água filtrada ou fervida. Administrar 100 a 150mL/kg de peso corporal em período de 4 a 6 horas. Se nas primeiras duas horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.

Texto de rotulagem

Advertência: Deve-se seguir atenção no preparo, usando a quantidade de água recomendada e, previamente fervida. Após o preparo da solução o que não for consumido em 24 horas deve ser desprezado.

Precauções: Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

Contraindicação: Contraindicado para pacientes com íleo paralítico, obstrução ou perfuração intestinal e nos vômitos incoercíveis (não contidos). Não interagem com alimentos e nem com outros fármacos. Não se observa reação adversa com a posologia recomendada.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.